

DOSAGE DE CYSTINE INTRA-LEUCOCYTAIRE

A partir du 1er Janvier 2019

Sur rendez –vous exclusivement, les Mercredi toute la journée, Jeudi avant 13h

Tel : 01 44 49 58 58

CONDITIONS DE PRELEVEMENT

A) SUIVI DE TRAITEMENT

- Prélever 5 à 10 ml de sang sur tube **ACD (exclusivement)** 6 heures après la dernière prise de Cystagon, 30 min après la dernière prise de Procysbi.
- Renseigner les quantités de Cystagon ou Procysbi administrées, l'heure de la dernière prise ainsi que l'heure du prélèvement

B) DIAGNOSTIC (après accord du Biologiste)

- prélever 10 ml de sang sur tube **ACD (exclusivement)**. Joindre une lettre de renseignements cliniques

Conserver le prélèvement à température ambiante

Expédier le prélèvement à température ambiante sous 24 heures au laboratoire

(Nous vous rappelons que, la qualité de l'examen impose que le délai entre le prélèvement et l'arrivée au laboratoire n'excède pas 24h)

Adresse du laboratoire :

Service des explorations fonctionnelles

UH Métabolomique

Dr B.Chadefaux-Vekemans, Dr C. Pontoizeau

Groupe Hospitalier Necker-Enfants Malades

Tour Lavoisier 4^e étage

149 rue de sèvres

75743 Paris cedex 15

Bon de commande, cotation B650 4003 : 175,50 euros

Sans rendez-vous et en l'absence de bon de commande toute demande fera l'objet d'une non-conformité et ne sera pas traitée